



FICHES TECHNIQUES VALORISÉES DES CULTURES MARAÎCHÈRES ET INDUSTRIELLES

La culture de LAITUE


ITCMI 2010

	الخس	
	LAITUE	
	LETTUCE	
Nom botanique	<i>Lactuca sativa</i>	
Famille:	<i>Astéracées</i>	
Espèce originaire d'Egypte (4500 ans AJC), plante annuelle d'abord utilisée pour ses propriétés médicinales devenue aliment.		

I - PLANTE

- Nombre de graines au gramme : 800 à 1000.
- Longévité moyenne de la graine : 4 à 6 ans.
- Température de germination : 12- 15 °C.
- Plante des jours longs.
- Germination s'effectue 7 à 10 jours selon la température du sol.
- Cycle végétatif : Romaine : 70 à 135 jours.
Pommée : 60 à 85 jours.
Laitue à couper : 40 à 50 jours.

II - STADES PHENOLOGIQUES



- 09 : levée
- 10 : cotylédons étalés
- 13 : 03 feuilles étalées
- 41 : début de formation des têtes.
- 45 : la tête a atteint 50% de sa taille finale.
- 49 : les têtes ont atteint leur grandeur, forme et dureté typique.
- 51 : la pousse principale à l'intérieur de la tête commence à sortir.
- 61 : début de la floraison.
- 75 : maturation des graines.

III - VARIETES LES PLUS CULTIVEES EN ALGERIE

Elles sont classées en groupes.

- **Laitue à couper** : laitue blonde, laitue frisée d'Amérique
- **Laitue pommées** : reine de mai, gotte jaune d'or, batavia, merveille des 4 saisons, tête de Nîmes, divina..
- **Laitue romaines** : Balen, blonde maraîchère.
- Les variétés de laitue sont classées dans les groupes suivants :

- Laitue beurre pommés : feuilles lisses ou légèrement cloquées comme reine de mai ,merveille de 4 saisons
- Batavia : feuilles ondulées aux nervures comme batavia, gotte jaune d'or
- Romaine : à pomme oblongue non serré comme Balen, blonde maraîchères
- Laitue à couper ou laitue frisée : laitue blonde, laitue frisée d'Amérique

IV - EXIGENCES

- Aime les sols argileux, bien pourvus en matières organiques, sains et sans excès d'eau.
- Température optimum : 15 à 20°C, très exigeante en lumière.
- La laitue est très exigeante en humidité du sol et de l'air.
- Qualité et rendement peuvent diminuer en cas de température élevée > 20 °C
- résiste au froid -5 à - 6°C. salinité : 3 à 5 mm/hos/cm⁻¹
- pH : 6 à 6,5

V- ZONES DE PRODUCTION

Toutes les zones d'Algérie.

VI - MISE EN PLACE DE LA CULTURE

- Labour 20 à 25 cm, surface finement motteuse.
- Hersage+planage.

6.1- SEMIS

Les semis peuvent se faire durant toute l'année, cependant les semis de mai et juin (risque de montaison en graines des laitues).



6.2- ENTRETIEN DE LA CULTURE

Désherbage

6.3 - FERTILISATION

- ✚ **Fumure de fond** : Organique 20 t / ha de fumier.
Minérale : 30 unités de N/ ha
50 unités de P/ ha
100 unités de K/ ha



- **Fumure d'entretien** : 2 apports,

1^{er} apport 20 jours après plantation : 50 unités de N/ha

2^{ème} apport début pomaison : 40 unités de N/ha


Apporter toute la fumure de fond du fait que la laitue couvre rapidement le sol.

6.4- IRRIGATION

La laitue est très exigeante en humidité du sol et de l'air.

Besoins estimés **4500 m³ / ha**

VII - PROTECTION SANITAIRE



VIII - RECOLTE

Manuelle, se fait lorsque les pommes sont **serrées et pleines**, 30 à 40 t / ha



FTV : LA CULTURE DE LAITUE DE PLEIN CHAMP (1HA)
RDT : 150 QX/HA

Opérations	Main d'œuvre			Matériel			Approvisionnement			Total DA
	Nbre J	Coût unitaire	Montant DA	Nbre H	Coût unitaire	Montant DA	quantité	Coût unitaire	Montant DA	
I. Pépinière :										
- Semence	-	-	-	-	-	-	1,5 kg	2 000	3000	3000
- Mise en place pépinière entretien	2	600	1200	-	-	-	-	-		1200
-Tourbe + fumier	-	-		-	-	-	5 sacs	1000	5000	5000
							10 T	1200	12000	12000
S/T	2	-	1200	-	-	-	-	-	20000	21200
II. Travaux du sol										
- Fumier	0,5	600	300	4	500	2000	30 T	1200	36000	38300
- Engrais minéral	0,5	600	300	4	500	2000	4 qx	6000	24300	26300
- Labour	1	600	600	8	500	4000	-	-		4600
- Fraisage	0,5	600	300	4	500	2000	-	-		2300
- Roulage	0,5	600	300	4	500	2000	-	-		2300
- Rayonnage	0,5	600	300	4	500	2000	-	-		2300
S/T	3,5	-	2100	28	-	14000	-	-	60000	76100
III. Plantation et entretien:										
- Pré- irrigation	1	600	600	-	-		-	-		600
- Plantation	25	600	15000	-	-					18000
- Désherbage	0,5	600	300	4	500	2000				2300
- Irrigation	08	600	4800				4000 m3	4	16000	20800
- Engrais (N)	2	600	1200	-	-		1 ql	6000	6000	7200
- Traitement + produits : Fong+insect	4	600	2400	8	500	4000			15000	24600
S/T	40,5	-	24300	12	-	6000	-	-	37000	67300
IV. Récolte et transport :										
- Récolte	20	600	12000	-	-		-	-		12000
- Transport	4	600	2400	16	500		-	-		2400
S/T	24	-	14400	16	-		-	-		14400
Total Général	70	-	42000	56	-	20000	-	-	117000	179000